



Comune di Mola di Bari

BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 18

Periodo: dal 01/09 al 07/09

Fase fenologica attuale (vite da tavola):

Fenofase: (BBCH 91 PRECOCI) - (BBCH 85 - 89 TARDIVE)


Elaborazione su base DSS *Agrigenius® Uva* (BASF)



A cura dell'Ufficio Tecnico Agriproject Group




FASE FENOLOGICA

									
Apertura gemme	Foglie distese	Grappoli separati	Bottoni florali separati	Fioritura	Allegagione	Pre chiusura grappolo	Chiusura grappolo	Maturazione acini	Raccolta

VARIETA' PRECOCI										
VARIETA' TARDIVE										

ZONE A VARIETA' DI RIFERIMENTO

- **Stazione meteo 1**
Località «Mazzoccolo»
NOTA: 1.2 km dal mare
Varietà: precoce
- **Stazione meteo 2**
Località «San Materno»
NOTA: 4.2 km dal mare
Varietà: tardiva



SITUAZIONE COMPLESSIVA

PERONOSPORA (*Plasmopara viticola*)

Dal momento in cui la maggior parte dei vigneti sono stati raccolti il rischio per il patogeno è escluso anche per la vegetazione, considerando che molti di essi sono dotati di **appareamenti protettivi**.

OIDIO (*Erysiphe necator*)

La pressione dell'oidio resta costante e attualmente permane la suscettibilità degli organi verdi della pianta quali rachide, acinelli e foglie. Per la settimana in oggetto il modello prevede rischio medio-basso di infezioni conidiche (secondarie).

BOTRITE (*Botrytis cinerea*)

Al momento il modello Agrigenius® Uva non prevede nessun rischio infettivo sia per l'areale precoce che per quello tardivo. Si consiglia comunque di monitorare le condizioni microclimatiche di ciascun vigneto e di gestire opportunamente la chioma per ridurre la densità e favorire la circolazione dell'aria, soprattutto nella zona grappoli.

SITUAZIONE COMPLESSIVA

TIGNOLETTA (*Lobesia botrana*)

Negli areali monitorati, precoci e tardivi, il modello indica terminata la terza generazione o seconda generazione carpofoaga del lepidottero con incremento dell'incrisalidamento delle larve.

COCCINIGLIE (*Planococcus ficus*)

Nella settimana in oggetto, negli areali tardivi e precoci, il modello prevede l'incremento della presenza di adulti.

LOCALITÀ 1: Mazzoccolo - Varietà precoce

OIDIO



Nella settimana in oggetto, il **DSS Agrigenius® Uva** prevede un basso rischio di infezioni secondarie. Tale rischio è riferito principalmente al rachide e agli organi verdi in quanto le bacche hanno perso la suscettibilità al patogeno dal momento dell'invasatura.


OIDIO

Per il periodo considerato, nei vigneti di varietà precoci non ancora raccolti, la **pressione infettiva** è **bassa** a livello dei **grappoli** mentre per gli **organi verdi**, compreso il **rachide**, la **pressione infettiva** si mantiene su livelli **medio-alti** con una tendenza al miglioramento.

Pressione infettiva su grappolo




Pressione infettiva su foglia



LOCALITÀ 1: Mazzoccolo - Varietà precoce

BOTRITE




Nella settimana in oggetto, il **DSS Agrigenius® Uva** non segnala alcun **rischio infettivo**.

TIGNOLETTA

LOCALITÀ 1 Mazzoccolo - Varietà precoce

3° generazione - Popolazione presente (%)




Secondo il **DSS Agrigenius® Uva**, la terza generazione del lepidottero è **terminata**. Il DSS pronostica nella settimana in oggetto il prosieguo dell'**incrisalidamento** delle larve.

PLANOCOCCO

LOCALITÀ 1 Mazzoccolo - Varietà precoce

3° generazione - Popolazione presente (%)



Il modello **Agrigenius® Uva** pronostica la presenza di **adulti** di terza generazione. Nei vigneti colpiti e non trattati, in questa fase si possono riscontrare tutti gli stadi evolutivi del coccide (ovisacchi, neanidi di diversa età e femmine mature).

LOCALITÀ 2: San Materno - Varietà tardiva

PERONOSPORA



Per la settimana in oggetto il modello **Agrigenius® Uva** non prevede alcun rischio infettivo.

LOCALITÀ 2: San Materno - Varietà tardiva

OIDIO




Il DSS **Agrigenius® Uva**, per la settimana in oggetto, prevede rischio **medio** di **infezioni secondarie** per la fine della settimana. Tale rischio è riferito principalmente al rachide e agli organi verdi in quanto le bacche hanno perso la suscettibilità al patogeno dal momento dell'invaiaitura.


OIDIO

Nel periodo considerato il livello di **pressione infettiva** si mantiene su valori **medi** per i **grappoli/rachide** mentre per tutti gli **organi verdi** la pressione è **medio-alta**.

Pressione infettiva su grappolo




Pressione infettiva su foglia



LOCALITÀ 2: San Materno - Varietà tardiva

BOTRITE




Nella settimana in oggetto, il **DSS Agrigenius® Uva** non indica alcun rischio di infezioni.

TIGNOLETTA

LOCALITÀ 2 San Materno - Varietà tardiva

3° generazione - Popolazione presente (%)




Secondo il **DSS Agrigenius® Uva**, la terza generazione del lepidottero è **terminata**. Il DSS pronostica nella settimana in oggetto il prosieguo dell'**incrisalidamento** delle larve.

PLANOCOCCO

LOCALITÀ 2 San Materno - Varietà tardiva

3° generazione - Popolazione presente (%)



Il DSS **Agrigenius® Uva** pronostica l'**incremento** della popolazione di **adulti** che nella settimana raggiungerà il picco massimo.

BASF
We create chemistry

Agrigenius®
Uva

Il DSS che monitora costantemente le condizioni in campo e fornisce allerte e consigli operativi

Internal