



Comune di Mola di Bari

BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 24

Periodo: dal 13/10 al 19/10

Fase fenologica attuale (vite da tavola):

Fenofase: (BBCH 91 - 93 PRECOCI) - (BBCH 89 TARDIVE)


Elaborazione su base DSS *Agrigenius® Uva* (BASF)



A cura dell'Ufficio Tecnico Agriproject Group




FASE FENOLOGICA

									
Apertura gemme	Foglie distese	Grappoli separati	Bottoni fiorali separati	Fioritura	Allegagione	Pre chiusura grappolo	Chiusura grappolo	Maturazione acini	Raccolta

VARIETA' PRECOCI										
VARIETA' TARDIVE										

ZONE A VARIETA' DI RIFERIMENTO

- **Stazione meteo 1**
Località «Mazzoccolo»
NOTA: 1.2 km dal mare
Varietà: precoce
- **Stazione meteo 2**
Località «San Materno»
NOTA: 4.2 km dal mare
Varietà: tardiva



SITUAZIONE COMPLESSIVA

OIDIO (*Erysiphe necator*)

La pressione dell'oidio resta costante e permane la suscettibilità degli organi verdi della pianta quali rachide, acinelli verdi e foglie. Per l'inizio della settimana il modello prevede rischio medio di infezioni conidiche (secondarie).

SITUAZIONE COMPLESSIVA

BOTRITE (*Botrytis cinerea*)

Al momento il modello Agrigenius® Uva pronostica un livello di rischio infettivo medio-basso sia per l'areale precoce che per quello tardivo. Si consiglia comunque di monitorare le condizioni microclimatiche di ciascun vigneto ricordando che la fase più critica per l'insorgenza della malattia va dall'invasatura alla raccolta. In questa fase, alcuni fattori possono comunque aumentare la probabilità di infezione, anche in assenza di un rischio simulato.

Fattori ambientali e climatici da considerare:

- Elevata umidità relativa, temperature miti (15 – 30 °C), intensità e durata delle piogge, presenza di rugiada persistente, uso eccessivo o poco razionale dell'irrigazione, numero di ore di bagnatura degli organi della pianta

Fattori agronomici e colturali che aumentano la suscettibilità:


- Cultivar particolarmente sensibili, grappoli troppo serrati o acini lesionati, presenza storica della malattia in vigneti o aree specifiche, epoca di raccolta prevista

Pratiche agronomiche utili alla prevenzione:

- Defogliazione mirata per favorire l'aerazione dei grappoli, corretta gestione idrica, controllo degli insetti che possono favorire indirettamente le infezioni, mantenimento di un equilibrio nutrizionale adeguato.

LOCALITÀ 1: Mazzoccolo - Varietà precoce

OIDIO




Il **DSS Agrigenius® Uva** prevede un rischio **medio** di infezioni secondarie per l'inizio della settimana. Si ricorda che in questa fase la suscettibilità alla malattia è legata a **rachide** e **organi verdi**.


OIDIO

Nei vigneti non ancora raccolti dell'areale precoce, la **pressione infettiva** è **bassa** a livello dei **grappoli** mentre per gli **organi verdi**, compreso il **rachide**, si mantiene su livelli **alti** con un andamento verso il miglioramento.

Pressione infettiva su grappolo




Pressione infettiva su foglia



LOCALITÀ 1: Mazzoccolo - Varietà precoce

BOTRITE




Il **DSS Agrigenius® Uva** segnala un **medio** rischio infettivo per l'inizio della settimana. Si ricorda che la fase più critica per l'insorgenza della malattia va dall'**invaiaatura** alla **raccolta**. Prestare attenzione alle eventuali **bagnature prolungate** dei grappoli soprattutto nei vigneti sotto rete.

BOTRITE

Attualmente il DSS pronostica un **incremento** dei **conidi** sui **grappoli** che successivamente matureranno producendo il **micelio**.

Rischio cumulato



LOCALITÀ 2: San Materno - Varietà tardiva

OIDIO




Il DSS **Agrigenius® Uva**, per l'inizio della settimana, prevede rischio **medio** di infezioni secondarie. Tale rischio è riferito principalmente al **rachide** e agli **organi verdi** in quanto le bacche hanno perso la suscettibilità al patogeno dal momento dell'invaiaatura.


OIDIO

Nella località indicata, il livello di **pressione infettiva** è **basso** per i **grappoli** mentre per tutti gli **organi verdi** e anche per il **rachide** il livello di pressione è **alto** ma in netta diminuzione.

Pressione infettiva su grappolo




Pressione infettiva su foglia



LOCALITÀ 2: San Materno - Varietà tardiva

BOTRITE



Il **DSS Agrigenius® Uva** segnala un **medio** rischio infettivo per l'inizio della settimana. Si ricorda che la fase più critica per l'insorgenza della malattia va dall'**invaiaatura** alla **raccolta**. Prestare attenzione alle eventuali **bagnature prolungate** dei grappoli soprattutto nei vigneti sotto rete.

BOTRITE

Attualmente il DSS pronostica un **incremento** dei **conidi** sui **grappoli** che successivamente matureranno producendo il **micelio**.

Rischio cumulato

